

---

**О рекомендациях, как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса**

# СТОП COVID-19

## КАК П



1. Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) после прививки уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли и отека в месте укола?

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна.



2. Что делать, если после прививки возникает гриппоподобная реакция – повышается температура, болит голова и др.?

- Не у всех может быть подобная реакция, но, если она есть, это нормально. Допускается симптоматическая терапия.

15.06.2021 г.

Роспотребнадзор напоминает, что в Российской Федерации проходит массовая бесплатная

Почему важно привиться именно сейчас? Лето традиционно считается временем, когда ч  
продукты богатые витаминами и микроэлементами – сезонные овощи и фрукты, люди ча  
воздушно-капельным путем, значительно снижаются.

Поэтому очень важно провести вакцинацию летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему

Роспотребнадзор напоминает, что есть случаи, когда вакцинация от некоторых инфекций  
эпидемий и пандемий — бешенство, столбняк, клещевой энцефалит. В этих случаях, когда

С инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем от человека к человеку ситуа  
пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в теч  
человека человеку. Прививаясь от таких инфекций, вы делаете не только личный выбор, н  
что вакцинация особенно необходима, с учетом того, что от абсолютного большинства ви  
неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: око

Как подготовиться к прививке

1. Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки уменьши

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна. Более того, она только навредит. К  
Антигистаминные могут понадобиться пациентам, у которых есть соответствующий аллер  
стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны.

3. Что делать, если после прививки возникает гриппоподобный синдром – повышается тем

- Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается си  
обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами. По  
симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к вра

4. Что делать, если человек все-таки не уберется и после первой прививки подхватил кор

- В этом случае вторая доза вакцины не вводится.

5. Что делать людям с хроническими заболеваниями (хронический гастрит, другие заболе

- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, п  
проконсультироваться с лечащим врачом.

6. Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?

