


Об эффективности использования СИЗ при распространении острых респиратор

СТОП COVID-19

КО



Болеющий коронавирусом




МАКС

вероятно



Болеющий коронавирусом



С

вероятно

23.09.2020 г.

Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора п

В рамках проекта проводился анализ эффективности использования СИЗ (медицинская м

По результатам установлено, что среди лиц, использовавших СИЗ, количество инфициров

Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторн

При наличии контакта с больными острыми респираторными инфекциями, ношение меди
раз.

Медицинские маски для защиты органов дыхания рекомендуется использовать:

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно носить маску:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщател
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте повторно одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует утилизировать, желательно в пакете;

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедлен